

(参考資料) 有害事象共通用語基準(CTCAE v5.0 日本語訳 JCOG版)より抜粋、一部改変

有害事象	グレード				
	1	2	3	4	5
皮膚症状 (ざ瘡用皮疹)	体表面積の<10%をしめる紅色丘疹および・または膿疱で、そう痒や圧痛は伴わない	体表面積の10-30%をしめる紅色丘疹および・または膿疱で、そう痒や圧痛の有無は問わない	体表面積の>30%をしめる紅色丘疹および・または膿疱で、中等度または高度の症状を伴う	生命を脅かす：紅色丘疹および・または膿疱が体表のどの程度の面積を占めるかによらず、そう痒や圧痛の有無も問わないが、抗菌薬の静脈内投与を要する広範囲の局所の二次感染を伴う	死亡
口内炎(口腔粘膜炎)	症状がない、または軽度の症状：治療を要さない	経口摂取に支障がない 中等度の疼痛または潰瘍：食事の変更を要する	高度の疼痛：経口摂取に支障がある	生命を脅かす：緊急処置を要する	死亡
下痢	ベースラインと比べて<4回/日の排便回数増加	ベースラインと比べて<4-6回/日の排便回数増加：身の回り以外の日常生活動作の制限	ベースラインと比べて7回以上/日の排便回数増加：入院を要する：身の回りの日常生活動作の制限	生命を脅かす：緊急処置を要する	死亡
便秘	不定期または間欠的な症状：便軟化薬/緩下薬/食事の工夫/浣腸を不定期に使用	緩下薬または浣腸の定期的使用を要する持続的症狀：身の回り以外の日常生活動作の制限	排便を要する頑固な便秘：身の回りの日常生活動作の制限	生命を脅かす：緊急処置を要する	死亡
悪心(吐き気)	摂食習慣に影響のない食欲低下	顕著な体重減少、脱水または栄養失調を伴わない経口摂取量の減少	カロリーや水分の経口摂取が不十分：経管栄養/TPN/入院を要する	-	-
嘔吐	治療を要さない	外来での静脈内輸液を要する：内科的治療を要する	経管栄養/TPN/入院を要する	生命を脅かす	死亡
食欲不振	摂食習慣に影響のない食欲低下	顕著な体重減少、脱水または栄養失調を伴わない摂食量の変化：経口栄養剤による補充を要する	顕著な体重減少または栄養失調を伴う(例：カロリーや水分の経口摂取が不十分)：静脈内輸液/経管栄養/TPNを要する	生命を脅かす：緊急処置を要する	死亡
味覚障害(味覚不全)	食生活の変化を伴わない味覚変化	食生活の変化を伴う味覚変化(例：経口サプリメント)：不快な味：味の消失	-	-	-
全身倦怠感(疲労)	休息により軽快する疲労	身の回り以外の日常生活動作を制限するだるさがある、または元気がない状態	身の回りの日常生活動作を制限するだるさがある、または元気がない状態	-	-
末梢神経障害	症状がない：臨床所見または検査所見のみ	中等度の症状：身の回り以外の日常生活動作の制限	高度の症状：身の回りの日常生活動作の制限	-	死亡
浮腫(全身性浮腫)	診察で明らか：1+の圧痕浮腫	身の回り以外の日常生活動作に支障がある：内服治療を要する	身の回りの日常生活動作に支障がある：静脈内投与による治療を要する：皮膚の離開	生命を脅かす	死亡
呼吸困難	中等度の労作に伴う息切れ	きわめて軽度の労作に伴う息切れ：身の回り以外の日常生活動作の制限	安静時の息切れ：身の回りの日常生活動作の制限	生命を脅かす：緊急処置を要する	死亡